

Definicja kolekcji kanarków kolorowych i kształtnych

Aby cztery ptaki zostały uznane za kolekcję muszą być tej samej rasy, odmiany i typu. Muszą być zaobróczkowane od roku i całkowicie identyczne między sobą według:

– koloru podstawowego, w którym uwzględnia się różnice między „intensywnym” i „nieintensywnym” lub „mozaikowym”

– płci w przypadku widocznego dymorfizmu.

W przypadku niezgodności z tymi normami, każdy ptak zostanie oceniony normalnie (oddzielnie) i nie przydzielą się żadnych punktów harmonii. Zapisze się wyłącznie całkowitą sumę punktów czterech ptaków i niezależnie od wyniku kolekcja nie zostanie wyróżniona.

U kanarków kształtnych, mimo że podtrzymuje się wymagania jednolitości podstawowej cytowanej wcześniej, akceptowane są jako kolekcja:

– cztery ptaki łaciate (szeki), niezależnie od rysunku ale z podobnymi proporcjami łaciatości,
– kolekcja powinna być jak najbardziej jednolita

Jako wyjątki uznaje się: lankaszera, kanarka nadreńskiego i niemieckiego z koronką, u których melanina jest ograniczona do czubka głowy i lizarda, u którego położenie melaniny jest określone na dziobie i nogach oraz na upierzeniu. W tym przypadku powinno się przestrzegać rysunku płytki: ptaki z pełną albo prawie pełną płytką, lub ptaki z płytkami przerwany, lub ptaki bez płytki lub prawie bez niej.

Jednocześnie zostanie zaakceptowana kolekcja składająca się z kanarków lipo chromowych czystych i innych z jedną małą plamką melaninową o maksymalnej wielkości 1 cm² na głowie bądź ciele lub do 3 piór melaninowych występujących kolejno po sobie na ogonie lub jednym ze skrzydeł.

Uznaje się także odwrotny przypadek tzn. kolekcję składającą się z ptaków melaninowych czystych i innych z małą obecnością lipochromu w proporcjach i według wymagań omówionych w powyższym przypadku.

Źródło: C.O.M. Les Nouvelles Nr.6 Październik 2009 str.48-tłumaczenie z
Orginału pt."DEFINITION D'UN STAM"